

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINAS	ESQUEMA
Primeira Visita	BCG ²	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B	1ª DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ³	1ª DOSE
	VIP	1ª DOSE
	HPV ⁴	1ª DOSE
2 meses após primeira visita	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA-SCR ⁵	1ª DOSE
	MENINGOCÓCICA ACWY ⁷	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B ⁶	2ª DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ³	2ª DOSE
	VIP	2ª DOSE
4-6 meses após primeira visita	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA-SCR	2ª DOSE
	HPV ¹⁰	2ª DOSE
	HEPATITE B ⁸	3ª DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO	3ª DOSE
	VIP	3ª DOSE
A cada 10 anos, por toda a vida	FEBRE AMARELA ⁹	DOSE ÚNICA
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ⁹	REFORÇO

01. Adolescência: período entre 10 e 19 anos de idade. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, completar o esquema iniciado
02. A vacina BCG é indicada para pessoas de até 15 anos de idade
03. Caso a criança ou o adolescente tenha recebido 3 ou mais doses das vacinas pentavalente (DTP-Hib-Hepatite B), tetravalente (DTP-Hib), DTPa, dTpa, DTP, DT, dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose. Em caso de gravidez observar o calendário para gestante.
04. Vacina para papilomavirus humana para meninas e meninos de 9 até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
05. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina SCR é de 4 semanas

Crianças (maiores de 7 anos e adolescentes)

06. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas
07. Adolescentes na faixa etária de 11 a 12 anos de idade, administrar a dose da Vacina meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina Meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço
08. O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
09. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina febre amarela antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação.
10. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina papilomavirus humano é de 6 meses
11. Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos. Em caso de gravidez observar o calendário para a gestante.

BCG – vacina contra tuberculose

VIP – vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)

DTP – vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana)

dT – vacina adsorvida difteria e tétano adulto

DT – vacina adsorvida difteria e tétano infantil

SCR – vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada)

HPV – vacina papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)

DTPa – vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular)

dTpa – vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) adulto

Você sabia quais são as falsas contraindicações à vacinação?

- Afeções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza; diarreia leve ou moderada; doenças da pele (leões impetiginosas esparsas, escabiose).
- História e/ou diagnóstico clínico progresso da doença no que diz respeito à aplicação da respectiva vacina.
- Desnutrição.
- Uso de qualquer tipo de antimicrobiano.
- Vacinação contra a raiva.
- Doença neurológica estável (exemplo: convulsão controlada) ou progressa com sequela presente.
- Antecedente familiar de convulsão.
- Tratamento sistêmico com corticosteroides nas seguintes situações: curta duração (inferior a duas semanas) independentemente da dose; doses baixas ou moderadas, independentemente do tempo; tratamento prolongado, em dias alternados, com corticosteroides de ação curta; doses de manutenção fisiológica.
- Alergias (exceto as de caráter anafilático) relacionadas com os componentes das vacinas.
- Reação cutânea ao timerosal.
- Prematuridade ou baixo peso ao nascimento. Nestes casos não se deve adiar o início da vacinação (exceção: vacinas BCG e hepatite B).
- Internação hospitalar. Esta é uma ótima oportunidade para atualizar o esquema de vacinação, desde que não haja contraindicação formal. Indicação da vacina poliomielite atenuada (oral), doses de rotina ou campanhas, devem ser avaliadas cuidadosamente.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde / CVE / Divisão de Imunização



QUEM AMA,
PROTEGE
QUEM PROTEGE,
VACINA

CALENDÁRIO VACINAL
Crianças & Adolescentes



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

www.SJC.sp.gov.br



IDADE	VACINAS	
A partir do nascimento	BCG ¹	<p>01. Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Os recém-nascidos de mães que utilizaram drogas imunodepressoras ou biológicos na gestação podem ter sua vacinação adiada ou contraindicada.</p> <p>02. A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita ocorrer após a 6ª semana de vida administrar a vacina pentavalente (DTP+Hib+HB).</p> <p>03. Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada).</p> <p>04. A vacina pentavalente (DTP-Hib-Hepatite B) NÃO deve ser administrada antes de 6 semanas de vida, pois poderá induzir tolerância imunológica às doses adicionais dos componentes Hib e Pertussis.</p> <p>05. A 1ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 2 meses de idade. Idade mínima para a administração desta dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias</p> <p>06. A vacina Pneumocócica 10 valente NÃO deve ser administrada antes de 6 semanas de vida. A vacina pneumocócica 10-valente pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade</p> <p>07. A 2ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para a administração desta dose é de 3 meses e 15 dias, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas da 1ª dose para a 2ª dose, e a idade máxima é de 7 meses e 29 dias. A vacina tetraviral deverá ser administrada em crianças que já receberam uma dose de sarampo/caxumba/ rubéola.</p> <p>08. As vacinas meningocócica C e hepatite A, no calendário de rotina, podem ser administradas até 4 anos, 11 meses e 29 dias de acordo com a situação vacinal.</p> <p>09. Vacina oral poliomielite 1,3, atenuada.</p> <p>10. A vacina DTP (difteria, tétano e pertussis) só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 7 anos de idade utilizar a vacina dT (dupla tipo adulto)</p> <p>11. A vacina tetraviral deverá ser administrada para crianças que já receberam uma dose de sarampocaxumba-rubéola, respeitando intervalo mínimo de 4 semanas</p> <p>12. A vacina varicela, no calendário de rotina, pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.</p> <p>13. A 2ª dose da vacina febre amarela deve ser administrada aos 4 anos de idade. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Nos sistemas de informação esta dose é registrada como reforço.</p> <p>14. Disponível na rede pública durante os períodos de campanha, para crianças a partir de 6 meses de idade até 5 anos, 11 meses e 29 dia</p> <p>BCG - Vacina BCG (contra tuberculose) VIP - Vacina poliomielite 1, 2, e 3 (inativa) VOP - Vacina poliomielite 1, 2, e 3 (Atenuada) SCR - Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana) VOPb - Vacina poliomielite atenuada 1 e 3</p> <p>Fonte: Secretaria de Estado da Saúde / CVE / Divisão de Imunização-2021</p>
	HEPATITE B ²	
2 meses	VACINA VIP ³	
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB) ⁴	
	ROTAVÍRUS ⁵	
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE ⁶	
3 meses	MENINGOCÓCICA C	
4 meses	VACINA VIP	
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB)	
	ROTAVÍRUS ⁷	
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	
5 meses	MENINGOCÓCICA C ⁸	
6 meses	VACINA VIP	
	PENTAVALENTE (CTP+Hib+HB)	
9 meses	FEBRE AMARELA	
12 meses	SARAMPO / CAXUMBA / RUBÉOLA (SCR)	
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	
	MENINGOCÓCICA C	
15 meses	TETRAVIRAL (SCR+VARICELA) ¹¹	
	VOP ⁹	
	DTP ¹⁰	
	HEPATITE A ⁸	
4 anos	VOP	
	DTP	
	VARICELA (2ª DOSE) ¹²	
	FEBRE AMARELA ¹³	
Anualmente	INFLUENZA ¹⁴	